





ИНКРЕСИНК®

(алоглиптин + пиоглитазон)

**Новый подход к преодолению барьера
инсулинорезистентности**



УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА^{4, 5}

- Воздействует на основные звенья патогенеза СД 2-го типа⁶
- Способствует эффективному и длительному удержанию гликемического контроля⁷⁻⁹
- Обладает рядом плейотропных эффектов:

- ✓ Кардиопротекция и снижения СС рисков: инфаркта миокарда, инсульта, СС смертности⁹
- ✓ Замедление прогрессирования СД 2-го типа, отсрочка инсулинотерапии^{7, 8}
- ✓ Улучшение липидного спектра^{6, 10}
- ✓ Замедление прогрессирования атеросклероза¹⁰
- ✓ Снижение воспаления, НАЖБП¹⁰

- Удобство применения – 1 таблетка в день, вне зависимости от приема пищи⁴

MACE — сердечно-сосудистая смертность, нефатальный инсульт и нефатальный инфаркт миокарда, СС рисков — сердечно-сосудистых рисков, СС смертности — сердечно-сосудистой смертности, СД2 — сахарный диабет 2-го типа, НАЖБП — неалкогольная жировая болезнь печени.

* Добавление Инкресинка (25 мг/30 мг) к стабильной дозе метформина ≥ 1500 , при исходном уровне HbA1c 8,5%.

** Назначение Инкресинка (25 мг/30 мг) пациентам без предшествующей сахароснижающей терапии, при исходном уровне HbA1c 8,8%.

*** Конечная точка MACE — большие нежелательные (неблагоприятные) сердечно-сосудистые события. Комбинированная конечная точка времени до развития всех случаев сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда без смертельного исхода и инсульта без смертельного исхода.

Для просмотра инструкции по применению отсканируйте QR-код:



1. DeFronzo R.A., et al. J Clin Endocrinol Metab. 2012 May; 97 (5): 1615-22. 2. Rosenstock J., et al. Diabetes Care 2010; 33: 2406-2408. 3. Wilcox R, Kupfer S, Erdmann E; PROactive Study investigators. Effects of pioglitazone on major adverse cardiovascular events in high-risk patients with type 2 diabetes: results from PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macro Vascular Events (PROactive 10). Am Heart J. 2008 Apr;155(4):712-7. 4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Инкресинк®. 5. Единственная комбинация иДПП-4 и пиоглитазона в РФ <https://grls.rosminzdrav.ru>, дата обращения 08.06.2022. 6. Triplitt C., et al. Vasc. Health Risk Manag. 2010 Sep. 7; 6: 671-90. 7. DeFronzo R.A., et al. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012; 97: 1615-1622. 8. Bosi E., et al. Diabetes Obes. Metab. 2011; 13: 1088-1096. 9. Rosenstock J., et al. Diabetes Care. 2010. 10. Scherthaner G., et al. Diabetes Care. 2013; 36 (Suppl. 2): S155-S161.

100824
АО «НИЖФАРМ», 603950, Россия,
г. Нижний Новгород, Бокс № 459, ул. Салганская, 7.
Тел.: +7 (831) 278-80-88, +7 (800) 250-50-00.
Факс: +7 (831) 430-72-13,
www.stada.ru.

Больше информации на сайте
www.endocrinology.ru —
отсканируйте QR-код!



101754

